

## Mathematik \* Jahrgangsstufe 9 \* Binomische Formeln

1. Multipliziere aus und fasse neu zusammen!

- a)  $(3x - 5y)^2 - (3x + 5y)^2$                       b)  $\frac{2}{3}(6a - 1,5b)^2 - 3a(8a - 4b)$
- c)  $(0,5x - y)^2 - (0,5x - y) \cdot (0,5x + y)$                       d)  $(\frac{1}{3}x - 2)^2 + \frac{1}{3} \cdot (x + 2)^2$
- e)  $(2x - 3)^2 - 2 \cdot (x + 3)^2 - \frac{1}{2} \cdot (6 - 2x)^2$                       f)  $\frac{1}{3} \cdot (1,5a - b)^2 - \frac{3}{4} \cdot (\frac{1}{3}b + a)^2$
- g)  $(a - 0,4b)^2 - 2 \cdot (0,3b - 0,5a)^2 + 0,2 \cdot (a + 0,1b)^2$

2. Faktorisiere, aber nur falls möglich!

- a)  $289x^2 - 100$                       b)  $1 + 8x + 4x^2$
- c)  $1 + 4x + 4x^2$                       d)  $2x^2 - 10x + 12,5$
- e)  $49x^2 + 64y^2 - 112xy$                       f)  $2x^2 - 8xy + 2y^2$
- g)  $48y^3 - 147x^2y$                       h)  $108a^2 + 147 - 252a$
- i)  $2x^2 - 6xy + 2,25y^2$                       k)  $2x^2 - y^2$

3. Ergänze!

- a)  $x^2 - 6xy + \dots = (\dots)^2$                       b)  $2a^2 - 4a + \dots = 2 \cdot (\dots)^2$
- c)  $x^2 - \frac{1}{5}xy + \dots = (\dots)^2$                       d)  $y^2 + 0,6xy + \dots = (\dots)^2$
- e)  $3a^2 + 1,5a + \dots = 3 \cdot (\dots)^2$                       f)  $4x^2 + 0,25y^2 + \dots = (\dots)^2$
- g)  $9a^2 + 9ab + \dots = (\dots)^2$                       h)  $9a^2 + 6ab + \dots = (\dots)^2$
- i)  $5x^2 - 4xy + \dots = 5 \cdot (\dots)^2$                       k)  $\frac{1}{4}a^2 + 6a + \dots = (\dots)^2$

4. Gib den größtmöglichen Definitionsbereich an und vereinfache so weit wie möglich!

- a)  $\frac{5x^2 - 20x + 20}{x - 2}$                       b)  $\frac{3x^2 + 6x + 3}{2x + 2}$
- c)  $\frac{2a^2 - 12a + 18}{a^2 - 9}$                       d)  $\frac{x^2 + 2x + 1}{2x^2 - 2}$



## Mathematik \* Jahrgangsstufe 9 \* Binomische Formel \* Lösungen

1. a)  $(3x-5y)^2 - (3x+5y)^2 = 9x^2 - 30xy + 25y^2 - (9x^2 + 30xy + 25y^2) = -60xy$   
 b)  $\frac{2}{3}(6a-1,5b)^2 - 3a(8a-4b) = 24a^2 - 12ab + 1,5b^2 - (24a^2 - 12ab) = 1,5b^2$   
 c)  $(0,5x-y)^2 - (0,5x-y) \cdot (0,5x+y) = 0,25x^2 - xy + y^2 - (0,25x^2 - y^2) = 2y^2 - xy$   
 d)  $(\frac{1}{3}x-2)^2 + \frac{1}{3} \cdot (x+2)^2 = \frac{1}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 4 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{3} = \frac{4}{9}x^2 + \frac{16}{3}$   
 e)  $(2x-3)^2 - 2 \cdot (x+3)^2 - \frac{1}{2} \cdot (6-2x)^2 =$   
 $4x^2 - 12x + 9 - 2 \cdot (x^2 + 6x + 9) - \frac{1}{2} \cdot (36 - 24x + 4x^2) = \dots = -12x - 27$   
 f)  $\frac{1}{3} \cdot (1,5a-b)^2 - \frac{3}{4} \cdot (\frac{1}{3}b+a)^2 = \frac{1}{3} \cdot (2,25a^2 - 3ab + b^2) - \frac{3}{4} \cdot (\frac{1}{9}b^2 + \frac{2}{3}ab + a^2) =$   
 $6,75a^2 - ab + \frac{1}{3}b^2 - \frac{1}{12}b^2 - \frac{1}{2}ab - \frac{3}{4}a^2 = 6a^2 - 1,5ab + 0,25b^2$   
 g)  $(a-0,4b)^2 - 2 \cdot (0,3b-0,5a)^2 + 0,2 \cdot (a+0,1b)^2 = \dots = 0,7a^2 - 0,16ab - 0,018b^2$

2. a)  $289x^2 - 100 = (17x-10) \cdot (17x+10)$   
 b)  $1 + 8x + 4x^2$  ist nicht faktorisiert!  
 c)  $1 + 4x + 4x^2 = (1+2x)^2$   
 d)  $2x^2 - 10x + 12,5 = 2 \cdot (x-2,5)^2$   
 e)  $49x^2 + 64y^2 - 112xy = (7x-8y)^2$   
 f)  $2x^2 - 8xy + 2y^2 = 2 \cdot (x^2 - 4xy + y^2)$  nicht weiter faktorisiert!  
 g)  $48y^3 - 147x^2y = 3y \cdot (4y-7x) \cdot (4y+7x)$   
 h)  $108a^2 + 147 - 252a = 3 \cdot (36a^2 - 84a + 49) = 3 \cdot (6a-7)^2$   
 i)  $2x^2 - 6xy + 1,25y^2$  ist nicht faktorisiert!  
 k)  $2x^2 - y^2 = (\sqrt{2} \cdot x - y) \cdot (\sqrt{2} \cdot x + y)$



3. a)  $x^2 - 6xy + 9y^2 = (x-3y)^2$       b)  $2a^2 - 4a + 2 = 2 \cdot (a-1)^2$   
 c)  $x^2 - \frac{1}{5}xy + \frac{1}{100}y^2 = (x - \frac{1}{10}y)^2$       d)  $y^2 + 0,6xy + x^2 = (y+0,3x)^2$   
 e)  $3a^2 + 1,5a + \frac{3}{16} = 3 \cdot (a + \frac{1}{4})^2$       f)  $4x^2 + 0,25y^2 + 2xy = (2x+0,5y)^2$   
 g)  $9a^2 + 9ab + 2,25b^2 = (3a+1,5b)^2$       h)  $9a^2 + 6ab + b^2 = (3a+b)^2$   
 i)  $5x^2 - 4xy + \frac{4}{5}y^2 = 5 \cdot (x - \frac{2}{5}y)^2$       k)  $\frac{1}{4}a^2 + 6a + 36 = (\frac{a}{2} + 6)^2$

4. a)  $\frac{5x^2 - 20x + 20}{x-2} = \frac{5 \cdot (x-2)^2}{x-2} = 5 \cdot (x-2) = 5x-10$  mit  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$   
 b)  $\frac{3x^2 + 6x + 3}{2x+2} = \frac{3 \cdot (x+1)^2}{2 \cdot (x+1)} = \frac{3}{2} \cdot (x+1)$  mit  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$   
 c)  $\frac{2a^2 - 12a + 18}{a^2 - 9} = \frac{2 \cdot (a-3)^2}{(a-3) \cdot (a+3)} = \frac{2 \cdot (a-3)}{a+3} = \frac{2a-6}{a+3}$  mit  $D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$   
 d)  $\frac{x^2 + 2x + 1}{2x^2 - 2} = \frac{(x+1)^2}{2 \cdot (x-1) \cdot (x+1)} = \frac{x+1}{2 \cdot (x-1)}$  mit  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$