
Physik * Jahrgangsstufe 9 * Aufgaben zum Massendefekt

Das Bild zeigt für unterschiedliche Atomkerne die durchschnittliche Bindungsenergie pro Nukleon in der Einheit MeV. (Quelle: http://www.dpg-physik.de/gliederung/fv/p/info/pix/Bindungsenergie.jpg)




- a) Bestimme aus dem Diagramm die Energie in MeV, die erforderlich ist, um einen He4-Atomkern bzw. einen He3-Atomkern vollständig in seine einzelnen Bestandteile zu zerlegen.
- b) Wie viel Energie benötigt man, um von einem He4-Atomkern ein Neutron zu entfernen? Verwende zur Lösung der Aufgabe deine Ergebnisse aus Aufgabe a).
- c) In der Sonne findet folgende Kernreaktion statt:

$${}_{2}^{3}$$
 He + ${}_{2}^{3}$ He $\rightarrow {}_{2}^{4}$ He + ${}_{1}^{1}$ p + ${}_{1}^{1}$ p

Begründe mit deinen Ergebnissen aus a) und b), dass bei dieser Reaktion Energie frei wird und gib diese Energie in MeV an!

- d) Das Diagramm veranschaulicht, dass man durch Fusion von leichten Kernen zu schweren Kernen Energie gewinnen kann. Erläutere das!
- e) Auch durch Spaltung von schweren Kernen kann man Energie gewinnen.
 Im nebenstehenden Bild wird veranschaulicht, wie ein U235-Kern durch ein Neutron in zwei Bruchstücke gespalten wird.
 - Stelle die Reaktionsgleichung auf und ermittle mit Hilfe des Diagramms oben ungefähr die insgesamt freiwerdende Energie in der Einheit MeV.



f) Die thermische Reaktorleistung des Kernkraftwerks Isar 2 beträgt 3,95 GW. (Die elektrische Nettoleistung beträgt etwa 1,4 GW) Schätze ab, wie viele Kernspaltungen der angegebenen Art pro Sekunde dafür stattfinden müssen. Welche Menge an U235 ist dafür an einem Tag erforderlich?

Physik * Jahrgangsstufe 9 * Aufgaben zum Massendefekt * Lösungen

- a) Erforderliche Energie, um He4 in die Bestandteile zu zerlegen: $E \approx 4.7,1 \,\text{MeV} = 28,4 \,\text{MeV}$ Erforderliche Energie, um He3 in die Bestandteile zu zerlegen: $E \approx 3.2,5 \,\text{MeV} = 7,5 \,\text{MeV}$
- b) Entfernt man aus einem He4-Kern ein Neutron, so entsteht ein He3-Kern.
 Zur vollständigen Zerlegung von He4 benötigt man 28,4 MeV, zur vollständigen Zerlegung von He3 benötigt man noch 7,5 MeV.
 D.h. zum Abtrennen eines Neutrons vom He4-Kern braucht man damit 28,4 MeV 7,5 MeV = 20,9MeV.
- c) ³⁄₂ He + ³⁄₂ He → ⁴⁄₂ He + ¹⁄₁p + ¹⁄₁p
 Zum Zerlegen der beiden He3-Kerne (auf der linken Seite der Gleichung) benötigt man 2·7,5MeV = 15,0MeV, zum Zerlegen des He4-Kerns (auf der rechten Seite der Gleichung) werden 28,4 MeV benötigt.
 Bei der angegebenen Reaktion müssen daher 28,4 MeV 15,0MeV an Bindungsenergie frei werden.
- d) Da die Bindungsenergie pro Nukleon bei den leichten Kernen mit der Massenzahl zunimmt (Ausnahme nur der "Peak" bei He4), wird bei der Fusion zweier leichter Kerne Bindungsenergie frei. Will man dagegen Atomkerne miteinander verschmelzen, die schwerer als Fe-Kerne sind, dann ist dafür ersichtlich Energie erforderlich, denn hier nimmt im Diagramm die Bindungsenergie pro Nukleon leicht ab.
- e) $^{235}_{92}$ U + $^{1}_{0}$ n \rightarrow $^{89}_{36}$ Kr + $^{144}_{56}$ Ba + $3 \cdot ^{1}_{0}$ n + Energie Die Bindungsenergie des U 235-Kerns beträgt etwa 235·7,6MeV \approx 1,79GeV. Die Bindungsenergie des Kr 89-Kerns beträgt etwa 89·8,6MeV \approx 0,77GeV und die Bindungsenergie des Ba 144-Kerns beträgt etwa 144·8,2MeV \approx 1,18GeV. Bei der Reaktion wird daher die Energie 1,18GeV + 0,77GeV 1,79GeV = 0,16GeV frei.
- f) Bei einer thermischen Leistung von 3,95 GW müssen pro Sekunde 3,95 GJ Energie frei werden.
 Pro Kernreaktion werden 0,16 GeV = 0,16⋅10⁹⋅1,6⋅10⁻¹⁹ AsV ≈ 2,6⋅10⁻¹¹ J geliefert.

Die Anzahl N der pro Sekunde benötigten Reaktionen beträgt daher

